

Limitações dos tratamentos de transtornos

- ◉ Transtornos podem ser considerados como
- ◉ Psíquicos
- ◉ Psiquiátricos

Distúrbios psíquicos

- ◉ Alguns autores colocam como alterações de comportamento não acompanhadas de alterações de consciência
- ◉ Conceito de neurose
- ◉ Conceito de psicose

Transtornos de personalidade

- ◉ Quadros mentais que se caracterizam padrões desajustados de comportamento que não são suficientes definidos para considerarmos de natureza neurótica ou psicótica
- ◉ Podem ser quadros situacionais em função do meio ambiente

Síndrome do pânico

- ◉ Consiste em alterações de tal exagero de medo e ansiedade em razão de um momento de grande dificuldade do indivíduo
- ◉ Traduzindo se em grande desequilíbrio das ações do paciente, com quadro clínico associado.

Transtornos de stress

- ◉ Conceito de stress
- ◉ Stress momentâneo
- ◉ Stress crônico
- ◉ Distress
- ◉ Possui diferenças e semelhanças com síndrome do pânico

Esquizofrenia paranoide

- ◉ Das esquizofrenias seria o tipo mais corriqueiro
- ◉ Aparecimento de delírios primários
- ◉ persecutoriedade

Alucinações esquisofrênicas

- ◉ Escutar vozes
- ◉ Ver vultos
- ◉ Pessoas mortas
- ◉ Receber ordens divinas
- ◉ Estar sob missão divina

Distúrbio esquizofrenico

- ◉ Fica muito mais evidente quando o paciente é confrontado
- ◉ Há uma fragilidade importante quando tocado naquilo que é mais sensível

epilepsia

- ◉ Curto circuito cerebral
- ◉ Personalidade viscosa
- ◉ Possui relação com tipo constitucional
- ◉ Alterações anatômicas de encéfalo
- ◉ Tratamento clínico eficaz
- ◉ Tratamento cirúrgico que necessita follow up

Transtornos depressivos

- ◉ Junto às síndromes de pânico, são os mais frequentes em nosso meio
- ◉ Tristeza intensa, fadiga crônica, letargia e mesmo fadiga recorrentes, com muito pouco desejo de viver.

antidepressivos

- ◉ Seriam substâncias consideradas eficazes na remissão de sintomas provocados pela depressão
- ◉ Possuem 3 classes:
- ◉ Tricíclicos
- ◉ SSRI
- ◉ Inibidores da enzima MAO

Bioquímica da depressão

- ◉ Redução na transmissão dos impulsos ou dos sinais nervosos nas áreas do cérebro que regulam o humor e o bem estar do paciente (centro do prazer)
- ◉ Anormalidades que envolvem os neurotransmissores

- ◉ Os medicamentos só devem ser prescritos para problemas específicos
- ◉ Sedativos
- ◉ Abuso de drogas
- ◉ Overdose
- ◉ PODEM ALTERAR BIOQUIMICAMENTE O METABOLISMO

- ◉ NÃO DEVE SER PRESCRITA POR EFEITOS MÁGICOS

Dependência

- ◉ Real e infelizmente de muito difícil tratamento
- ◉ Do medicamento
- ◉ Do amuleto
- ◉ Do grupo de auto ajuda
- ◉ Do profissional

Testes de personalidade

- ◉ Pouco específicos
- ◉ Aleatórios e subjetivos
- ◉ Muito falhos
- ◉ Porém podem ajudar quanto a depressão e narcisismo

clínica


- ◉ Os tricíclicos são os mais eficazes no tratamento da depressão profunda
- ◉ SSRI em depressão moderada
- ◉ Inibidores da MAO possuem longa duração de ação
- ◉ Cuidados quanto toxicidade renal e principalmente hepática

A Depressão pode ser normal

- ◉ Na grande maioria, não há necessidade de introduzir tratamento clínico
- ◉ Pode ser em função de ambição, parto, menopausa e perdas de difícil aceitação.
- ◉ Apoio seria muito mais interessante

Classificação das depressões

- Muito polêmica.
- Transtornos depressivos maiores
- Distímicos
- Depressões não específicas
- Bipolares



Mediadores químicos

- Dopamina
- Adrenalina
- Serotoninas
- São as principais responsáveis pela mediação da satisfação

5 Ht serotonina

- Existem em neurônios, células cromoafins do trato gastrointestinal (triptofano nas dietas)
- plaquetas carregam a 5 Ht serotonina do intestino para todo o organismo

Serotonina e sua importância

- ◉ Inibição direta ou indireta do GABA
- ◉ Fome
- ◉ Atividade sexual
- ◉ Vigor e fadiga
- ◉ Ciclos circadianos
- ◉ Em função do receptor 5HT1D pode ter um efeito anti-enzimático sem ser vasoconstritor

- ◉ Com o uso dos ISSR é de se esperar uma maior concentração de serotonina na fenda sináptica e uma menor concentração disponível na superfície das plaquetas.
- ◉ Portanto é também importante no fenômeno da coagulação
- ◉ Sensação de boca seca devida a redução do fluxo salivar, aumento da prolactina e perda do apetite

Principais grupos de antidepressivos

- ◉ Inibidores da monoaminoxidase:
- ◉ A. não seletivos e irreversíveis:
- ◉ Isocarboxazida
- ◉ Iproniazida
- ◉ feneizina

- ◉ Seletivos e reversíveis:
- ◉ Moclobemida
- ◉ Brofaromina
- ◉ blofoximona

Antidepressivos tricíclicos

- ◉ Amitriptilina
- ◉ Noritriptilina
- ◉ imipramina

Os mais usados

- ◉ Fluoxetina : prozac verotina fluxene daforin
- ◉ Paroxetina : aropax benepax pondera cebrelin
- ◉ Sertralina : zoloft tolrest novativ
- ◉ Venlafaxina : efexor venlift
- ◉ Escitalopran : lexapro
- ◉ Nortriptilina : pamelor

- ◉ A depressão pode ser encontrada em salmo 38 : 6 a 8
- ◉ Salmo 102 : 4 a 7
- ◉ Salmo 77 : 4 a 6
- ◉ O pavor está relatado em Isaías 17:14
- ◉ A cura está em salmos 118, 107 :19, 103:1 a 4

- ◉ E, VOCÊS SABEM MUITO MAIS QUE EU
- ◉ MUITO OBRIGADO!
- ◉ RENAN
